



Recomendación nutricional de abonos foliares en cultivo de caña, según fases vegetativas

FASE DE GERMINACION Y ESTABLECIMIENTO. Brotación de yemas vegetativas, aplicar a los 20 dias del transplante

Productos Agricolas	Dosis: Ha. / Lts.	Dosis: Ha. / Kgs.	Elementos del producto
Promi-Ferti-PK-Suprem	500 cc.		Quelatados, Nitrógeno 4,7% Fósforo 30% Potasio 42% EDTA 4,7%, Producción de yemas fructíferas
Bioestim Plus	500 cc.		N 13,3%-P 40%- K 13,3% y Aminoácidos, Anti estrés
Promi-Ferti-Combi	500 cc.		Quelatados, Mg 1,23% - Zinc 1,23% Mn 1,23% - Br 0,62% - Cobre 0,62%
Bio-Cytolan Algas	500 cc.	100 g.	Anti estrés Algas <i>Ascophyllum nodosum</i> 100% P 5% K 18% S 1%, Carbohidratos, auxinas, citoquininas, giberalinazas.

FASE DE AHIJAMIENTO. El ahijamiento le da al cultivo un número adecuado de tallos, que permiten tener una población adecuada, lo que dará paso a un buen rendimiento. Aplicar a los 60 dias.

Productos Agricolas	Dosis: Ha. / Lts.	Dosis: Ha. / Kgs.	Elementos del producto
Bioestim Ca+B	500 cc.		Fósforo 13,6%- Calcio 9,6%- Boro 0,6%
Bioestim Mn-Zn	500 cc.		Fósforo 48,3% Zinc 9,0% Manganeso 7% ayuda a daños causados x herbicidas, exceso de hierro
Bio-Cytolan Algas		100 g.	Anti estrés Algas <i>Ascophyllum nodosum</i> 100% P 5%, K 18%, S 1%, Carbohidratos, auxinas,citoquininas,giberalinazas.

E E

FASE DE GRAN CRECIMIENTO, 120 DIAS. Fase mas importante del cultivo, formación y elongación real de la caña y su rendimiento

Productos Agricolas	Dosis: Ha. / Lts.	Dosis: Ha. / Kgs.	Elementos del producto
Bioestim Plus	500 cc.		N 13,3%-P 40%- K 13,3% y Aminoácidos, Anti estrés
Bioestim Mn-Zn	500 cc.		Fósforo 48,3% Zinc 9,0% Manganeso 7% ayuda a daños causados x herbicidas, exceso de hierro
Bio-Cyto-Flow-Amin		100 g.	Aminoácidos libres 80% Nitrógeno Orgánico 12,2% - Anti Estrés
Bio-Cytolan Algas		100 g.	Anti estrés Algas <i>Ascophyllum nodosum</i> 100% P 5%, K 18%, S 1%, Carbohidratos, auxinas citoquininas, giberalinazas.

FASE DE GRAN CRECIMIENTO, 180 DIAS. Es la fase mas importante del cultivo, formación y eslongación real de la caña y su rendimiento

Productos Agricolas	Dosis: Ha. / Lts.	Dosis: Ha. / Kgs.	Elementos del producto
Bioestim Mn-Zn	500 cc.		Fósforo 48,3% Zinc 9,0% Manganeso 7% ayuda a daños causados x herbicidas, exceso de hierro
Bioestim Plus	500 cc.		N 13,3%-P 40%- K 13,3% y Aminoácidos, Anti estrés
Bio-Cytolan Algas		100 g.	Anti estrés Algas <i>Ascophyllum nodosum</i> 100% P 5%, K 18%, S 1%, Carbohidratos, auxinas, citoquininas, giberalinazas.

FASE DE GRAN CRECIMIENTO, 120 DIAS. Fase mas importante del cultivo, formación y elongación real de la caña y su rendimiento

Corrección más rápida, Zinc (crecimiento brote, fecundación y cuaje), Boro (Fecundación Cuaje, pared celular, Magnesio (sólidos solubles), Calcio (Estructura), Potasio (Color y Calibre).

